

DOENÇA DE CHAGAS AGUDA NO PARÁ

Perfil epidemiológico 2021

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Em 2021 foram **275** casos de DCA

Aumento de **19,6%** em relação a 2020

Descartados 1.225
Ignorado/branco 77
Inconclusivos 203


4,6% 220,8% 2.155,6%

Percentuais em relação a 2020

1.780 Notificações


Aumento de **24,1%** em relação a 2020

Sexo




Incidência no estado de **0,3** casos por 10 mil habitantes


Modo de infecção



Local de infecção




Grupo etário




Os adultos (19-59 anos) representam a maioria dos casos

Gestantes/Trimestres




Zona de Residência




Fechamento oportuno em das notificações **68,5%**

Tratamento específico em dos casos **86,5%**

Critério de confirmação



Evolução




Exame parasitológico direto - Notificados



Aumento de **10,3%** em relação a 2020.


Confirmados por período



Centros Regionais e Regiões de Saúde

2020 N	2021 N	Regional	Variação em relação a 2020		Região	2021 N	2020 N
49	47	1º CRS	↓	-	Araguaia	0	0
2	1	2º CRS	↓	↓	Baixo Amazonas	4	5
6	4	3º CRS	↓	-	Carajás	0	0
1	6	4º CRS	↑	↑	Lago de Tucuruí	8	4
2	2	5º CRS	-	↓	Metropolitana I	47	49
57	54	6º CRS	↓	↓	Metropolitana II	1	2
21	21	7º CRS	-	↓	Metropolitana III	6	8
65	75	8º CRS	↑	↑	Rio Caetés	6	1
5	4	9º CRS	↓	-	Tapajós	0	0
2	6	10º CRS	↑	↑	Tocantins	101	73
2	8	11º CRS	↑	↑	Xingu	6	2
0	0	12º CRS	-	-	Marajó I	21	21
18	47	13º CRS	↑	↑	Marajó II	75	65
6º e 8º CRS			representaram 46,9%		Tocantins e Marajó II		abrangeam 64,0%

Municípios de residência



Surtos

Surto em **13,9%** dos municípios do estado

30,0% no 8º CRS

157 pessoas envolvidas

Conclusões

- Em 2021 os casos de DCA aumentaram 19,6% em relação a 2020.
- Abrangeu amplamente indivíduos de ambos os sexos, na faixa economicamente ativa e residentes da zona rural.
- Predominaram as infecções por via oral, em domicílio, diagnosticados laboratorialmente por exame parasitológico direto, com evolução para pacientes vivos e um óbito em gestante.
- A DCA possuiu 76,4% de ocorrência durante o 2º semestre, principalmente em setembro.
- O 6º CRS e 8º CRS foram as regionais que mais apresentaram casos de DCA, da mesma forma que as Regiões de Tocantins e Marajó II.

Recomendações: Cumprir meta de 100% do tratamento específico; melhorar vigilância ativa visando abolir casos inconclusivos e ignorados na classificação final e obedecer o tempo de encerramento oportuno de 60 dias, que conta a partir da data de notificação. Inserir dados provenientes de investigações de surto, no **Módulo surto** no SINAN.