

A Tuberculose é a primeira causa de morte entre as pessoas que vivem com HIV.

Comitê Estadual de Tuberculose

Participe das reuniões do Comitê, instância colegiada de caráter consultivo e propositivo, que realiza ações de comunicação, mobilização e advocacy da TB.

TUBERCULOSE TEM CURA

Diagnóstico, tratar e curar.
Procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua casa.

Informações:

Coordenação Estadual de Tuberculose
Fone: (91) 4006-4850
tuberculose.para@sespa.pa.gov.br



SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA



www.saude.pa.gov.br

   /sespapara

Tosse por mais de 03 semanas?

Cuidado!! Pode ser

TUBERCULOSE

TEM CURA - Diagnosticar, tratar e curar.



SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA



O que é Tuberculose?

É uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria do complexo Mycobacterium. A espécie mais importante é o M. tuberculosis (bacilo de Kock) que ataca principalmente os pulmões.

Como se transmite?

Através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente ao tossir, espirrar ou falar.

Quando as gotículas são inaladas por pessoas saudáveis, provocam a infecção tuberculosa e o risco de desenvolver a doença.

Quando infectada a pessoa pode desenvolver a tuberculose doença em qualquer fase da vida. Isso acontece quando o sistema imune não consegue mais manter os bacilos "sob controle" e eles se multiplicam rapidamente.

Quais os principais Sintomas?

Tosse, febre, cansaço, emagrecimento e suores noturnos.



Como se prevenir?

- **IMUNIZAÇÃO:** A vacina BCG confere proteção contra as formas graves da doença (meningite tuberculosa e tuberculose miliar).

A vacina é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, disponível nas unidades básicas de saúde;

- Uso de máscaras;
- Tratamento da Infecção latente – ILTB;

Tratamento

A TB é uma doença curável em quase 100% dos casos sensíveis ao esquema básico, se respeitada à associação adequada, dose correta e uso por tempo adequado.

O tratamento está disponível de forma gratuita e universal no Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema de tratamento é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), preferencialmente a unidade mais próxima à residência do usuário.

Os esquemas especiais são realizados de forma compartilhada entre as Referências e a Atenção Primária à Saúde.

Tuberculose e COVID

Não há recomendações específicas para prevenção do COVID-19 para as pessoas em tratamento da TB, sendo aplicáveis todas as medidas já recomendadas pelo Ministério da Saúde:

- Higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool a 70%;



- Evitar tocar olhos, nariz e boca;
- Evitar contato com pessoas doentes;
- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com o cotovelo flexionado (higiene da tosse) ou um lenço descartável;
- Ficar em casa, evitar ambientes públicos com aglomerados de pessoas;
- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Tuberculose e HIV/AIDS

O HIV é considerado um dos maiores fatores de risco para desenvolvimento da TB. Os indivíduos que convivem com HIV tem até 28 vezes mais chance de desenvolver a TB.

Todos os casos diagnosticados de TB devem ser testados para HIV, pois a co-infecção TB/HIV representa risco maior de agravamento e óbito.

Os casos de HIV positivos para TB devem ser encaminhados ao Serviço de Atenção Especializada (SAE) para o tratamento de TB e início oportuno da TARV (terapia antirretroviral).